



Engels raaigras – laat doorschietend

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten)

Rubricering 1)	Rasnaam	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroonroest	Droge stofopbrengst van de eerste snede (relatief)	Droge stofopbrengst (relatief), gewogen gemiddelde van beweidings- en maaiproefvelden	
Diploïde rassen								
A	Romark	3-6	8,0	7,2	7,7	99	103	
A	Burlina 1	3-6	8,0	7,2	7,6	100	103	
A	Jalinas	3-6	8,1	6,8	7,5	103	101	
A	Asturion	4-6	8,1	6,9	7,9	102	100	
	A	Astorga	4-6	8,2	7,0	8,3	93	100
	A	Tomaso	3-6	8,3	7,3	7,5	101	100
A	Bakuri 1	6-6	8,1	7,5	8,4	97	99	
A	Candia	3-6	8,3	7,0	7,6	97	99	
B	Tornado	4-6	8,3	7,3	7,3	98	101	
B	Cadans	8-6	8,0	7,5	8,1	93	97	
N	Candore	4-6	8,2	7,0	8,2	97	100	
N	Humbi 1	5-6	7,8	7,2	8,2	99	102	
N	Bovini	6-6	8,0	6,9	7,7	99	103	
N	Zenital	4-6	8,0	7,0	8,5	97	102	
Tetraploïde rassen								
A	Polim	3-6	7,7	7,5	8,6	108	100	
A	Alcander	4-6	7,9	7,4	9,0	100	99	
A	Barmaxima	4-6	7,9	7,5	7,5	99	101	
A	Bocage	3-6	8,1	7,7	9,2	101	96	
A	Herbal	5-6	7,8	7,4	8,1	100	98	
B	Cabriolet	7-6	7,6	6,7	9,0	99	96	
B	Barsaxo	4-6	8,2	7,6	8,2	99	96	
B	Altius	6-6	8,1	7,7	7,7	98	97	
B	Fornido	4-6	7,5	6,7	8,3	99	97	
B	Barsintra	9-6	7,9	7,6	9,0	95	94	
N	Barpasto	3-6	8,1	7,7	8,4	105	100	
N	Como	7-6	7,5	7,3	8,1	99	101	
N	Rivaldo	3-6	8,1	7,6	8,8	104	102	
N	Bovini	6-6	8,0	6,9	7,7	99	103	
N	Meltador	6-6	8,2	7,3	8,8	105	102	
N	Meracoli	4-6	7,9	7,4	8,8	106	102	

1) Rubricering in de Rassenlijst: A = algemeen aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras. Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken eigenschap.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Animal Sciences Group te Lelystad.
Productschap Akkerbouw

 = een ras te kiezen met Mengsel op Maat.

Engels raaigras – middentijds doorschietend

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten)

Rubricering 1)	Rasnaam	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroonroest	Droge stofopbrengst van de eerste snede (relatief)	Droge stofopbrengst (relatief), gewogen gemiddelde van beweide- en maaiproefvelden
Diploïde rassen							
A	Calvano 1	24-5	8,1	6,8	7,5	106	105
A	Arsenal	24-5	8,2	7,1	8,0	102	103
A	Rodrigo	25-5	8,2	7,2	7,5	104	104
A	Abosan 1	30-5	8,4	7,4	8,7	96	102
A	Toronto	24-5	8,1	7,2	7,8	106	102
A	Chicago	23-5	8,6	7,2	7,6	99	102
A	Option	26-5	8,2	7,0	8,6	99	100
A	Domiatti 1	28-5	7,9	6,7	8,6	98	101
B	Frisian 1	24-5	7,8	6,7	8,3	103	100
B	Sibasa	25-5	8,0	7,1	8,3	101	99
B	Orantas	24-5	8,0	7,0	7,8	101	100
B	Honroso	30-5	8,3	7,1	7,9	88	101
B	Gasata 1	1-6	8,1	7,1	8,2	92	99
B	Barata	23-5	7,8	7,1	7,6	102	100
B	Alvaro	26-5	8,1	6,9	7,8	97	99
B	Mateon 1	2-6	8,2	7,2	7,8	86	99
B	Laguna	26-5	7,9	7,2	7,7	96	98
B	Maestro	31-5	8,2	6,8	8,2	89	98
B	Denver	30-5	8,1	7,1	7,5	93	99
Tetraploïde rassen							
A	Pomposo	25-5	7,9	7,4	8,6	100	100
A	Trivos	25-5	7,7	6,6	8,9	102	99
A	Roy	24-5	8,1	7,2	7,9	102	99
A	Barelan	1-6	8,0	7,5	8,9	92	97
A	Cantalou	25-5	7,8	7,4	8,7	100	97
B	Modane	31-5	8,2	7,6	8,2	95	97
B	Barnauta	28-5	8,0	7,8	7,9	101	96
B	Elgon	1-6	7,7	7,5	7,9	94	97
N	Maurizio	24-5	8,3	7,5	8,7	108	102
N	Channi 1	30-5	7,5	7,5	9,1	98	98
N	Reality	28-5	8,0	7,5	8,6	98	98
N	Catabi 1	27-5	7,3	7,3	8,5	105	98
N	Charlene	24-5	8,0	7,0	8,9	97	97
N	Turmalin	30-5	8,2	7,4	8,6	96	98
N	Besser	25-5	8,0	7,5	8,5	107	101
N	Hurricane	30-5	8,0	7,2	8,9	102	101
N	Novello	2-6	8,1	7,4	8,8	95	101
N	Ovambo 1	27-5	8,0	7,5	8,7	105	99
N	Aventino	23-5	7,9	7,5	8,6	106	100

1) Rubricering in de Rassenlijst: A = algemeen aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras. Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken eigenschap. Het onderzoek is uitgevoerd door de Animal Sciences Group te Lelystad. Publicatie van de tabellen is toegestaan, mits de gegevens integraal en onder vermelding van 'Productschap Akkerbouw' worden overgenomen.

 = een ras te kiezen met Mengsel op Maat.

Engels raaigras – laat doorschietend

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten)

Rubricering 1)	Rasnaam	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroonroest	Droge stofopbrengst van de eerste snede (relatief)	Droge stofopbrengst (relatief), gewogen gemiddelde van beweidings- en maaiproefvelden
Diploïde rassen							
A	Romark	03-jun	8,1	7,3	7,7	100	104
A	Burlina 1	03-jun	8,1	7,1	7,5	101	104
A	Jalinas	03-jun	8,2	6,8	7,6	104	103
A	Asturion	04-jun	8,1	7	7,9	102	102
A	Tornado	04-jun	8,2	7,5	7,4	99	103
A	Tomaso	03-jun	8,3	7,3	7,5	101	101
A	Astorga	04-jun	8,1	7,1	8,3	92	99
A	Cadans	08-jun	8	7,5	8,1	95	99
B	Famoso	05-jun	8,2	7,3	6,7	100	104
B	Melland	05-jun	8,5	6,4	7,4	99	101
B	Cancan	10-jun	7,9	7,3	6,4	94	101
B	Barleone	07-jun	8,7	7,5	7,4	87	99
B	Barnhem	07-jun	8,2	7,2	7,3	88	99
N	Candia	03-jun	8,3	6,9	7,6	99	100
N	Bakuri 1	06-jun	8,1	7,5	8,5	98	100
Tetraploïde rassen							
A	Polim	03-jun	7,7	7,4	8,6	107	99
A	Herbal	05-jun	7,8	7,4	8,1	102	100
A	Bocage	03-jun	8	7,7	9,1	101	97
A	Cabriolet	07-jun	7,5	6,5	9	101	98
A	Barsaxo	04-jun	8,2	7,6	8,1	101	98
B	Altius	06-jun	8	7,8	7,7	99	99
B	Barsintra	09-jun	7,9	7,6	9	98	95
B	Fornido	04-jun	7,6	6,6	8,3	102	98
N	Barmaxima	04-jun	7,9	7,4	7,3	98	102
N	Alcander	05-jun	7,9	7,5	9	101	100
Nieuw in Rassenlijst 2009							
Diploïde rassen							
N	Candore	5-Jun	8,3	7	8,2	97	102
Tetraploïde rassen							
N	Barpato	3-Jun	8,1	7,6	8,4	107	101
N	Como	7-Jun	7,4	7,3	8,1	101	102

1) Rubricering in de Rassenlijst: A = algemeen aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras. Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken eigenschap.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Animal Sciences Group te Lelystad.
Productschap Akkerbouw

Engels raaigras – middentijds doorschietend

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten)

Rubricering 1)	Rasnaam	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroonroest	Droge stofbrengrst van de eerste snede (relatief)	Droge stofbrengrst (relatief), gewogen gemiddelde van beweideings- en maaiproefvelden
Diploïde rassen							
A	Calvano 1	25-mei	8,1	6,8	7,6	106	105
A	Option	26-mei	8,2	7,1	8,7	101	100
A	Chicago	23-mei	8,6	7,1	7,5	100	102
A	Domiatti 1	28-mei	7,9	6,7	8,6	99	100
A	Sibasa	25-mei	8,1	7,2	8,3	103	100
A	Orantas	24-mei	8	7,1	7,8	103	101
A	Honroso	30-mei	8,3	7,2	7,9	92	101
A	Barata	23-mei	7,8	7,1	7,6	103	101
B	Premium	25-mei	8	7,1	7	108	103
B	Bree	22-mei	8	7,1	7,2	106	103
B	Foresto	25-mei	8,1	7,4	7,2	103	103
B	Aberdart	20-mei	8,5	5,7	7,5	100	101
B	Avilena 1	29-mei	8	7,3	7,4	98	102
B	Gandalf	23-mei	7,7	6,2	7,1	100	102
B	Alvaro	26-mei	8	7	7,8	100	100
B	Mateon 1	02-jun	8,2	7,1	7,9	90	100
B	Laguna	26-mei	8	7,3	7,7	98	99
B	Denver	30-mei	8,1	7,1	7,5	94	99
B	Patricio	29-mei	8,3	7,2	7,5	93	98
B	Marley	31-mei	8,2	7,3	7,5	92	98
B	Baremon	26-mei	8,4	7,6	7,4	92	95
N	Arsenal	24-mei	8,3	7,2	8	104	103
N	Abosan 1	30-mei	8,5	7,4	8,7	98	102
N	Frisian 1	24-mei	7,8	6,8	8,3	105	100
N	Rodrigo	25-mei	8,2	7,2	7,5	106	104
N	Toronto	24-mei	8,1	7,2	7,8	109	102
N	Gasata 1	01-jun	8,2	7,1	8,2	94	100
N	Maestro	01-jun	8,2	6,9	8,1	91	98
Tetraploïde rassen							
A	Pomposo	25-mei	7,9	7,3	8,6	103	101
A	Trivos	25-mei	7,6	6,7	8,9	105	99
A	Roy	24-mei	8	7,1	7,9	103	99
A	Barelan	01-jun	8	7,6	8,9	95	97
A	Modane	31-mei	8,2	7,5	8,2	97	98
B	Barnauta	26-mei	8	7,9	7,9	105	97
B	Elgon	01-jun	7,7	7,5	7,9	96	97
N	Cantalou	25-mei	7,7	7,4	8,7	102	97
Nieuw in Rassenlijst 2009							
Tetraploïde rassen							
N	Maurizio	24-mei	8,3	7,5	8,7	111	102
N	Reality	28-mei	8	7,5	8,6	100	99
N	Channi 1	30-mei	7,5	7,5	9,1	100	99
N	Catabi 1	27-mei	7,4	7,2	8,6	108	99
N	Turmalin	30-mei	8,2	7,4	8,6	98	99
N	Charlene	25-mei	8	7	8,9	99	98

1) Rubricering in de Rassenlijst: A = algemeen aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras. Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken eigenschap. Het onderzoek is uitgevoerd door de Animal Sciences Group te Lelystad. Productschap Akkerbouw